



HEPILOR LIQUIDO®

Sciroppo per uso orale in Bustine Monodose da 10 ml

Dispositivo Medico Protettivo della Mucosa Gastrointestinale

HEPILOR Liquido è un dispositivo medico con proprietà specifiche di protezione della mucosa gastro-intestinale. Grazie alla presenza di sostanze funzionali di dimostrata efficacia protettiva e mucoadesiva aderisce alla mucosa gastro-intestinale, forma una barriera meccanica proteggendo in particolare le zone danneggiate ed infiammate; in caso di reflusso gastroesofageo consente di ottenere, in tempi rapidi, sollievo da: bruciore, pirosi e rigurgito acido.

Il complesso Zinco-carnosina e sodio alginato aderisce alla mucosa gastrointestinale isolando e proteggendo in particolare le zone danneggiate, alleviando la sintomatologia dolorosa, favorendo la normale ripielizzazione delle lesioni e migliorando la resistenza della mucosa agli attacchi di agenti irritanti.

COMPOSIZIONE:

Zinco-L-Carnosina, Sodio Alginato, Magnesio Idrossido, Glicerina, Sucralosio, Olio Essenziale di Arancio Dolce, Aroma, Metile p-idrossibenzoato, Acqua depurata.

Senza glutine - Senza lattosio

INDICAZIONI:

HEPILOR Liquido è indicato come protettivo della mucosa gastro-intestinale nei seguenti casi:

- Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da *Helicobacter Pylori*, da associare alla terapia farmacologica standard.
- Ulcere gastriche, ulcere duodenali
- Trattamento e prevenzione dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo (pirosi, rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia)
- Gastriti acute
- Gastriti uremiche
- Gastriti basiche
- Gastriti croniche (atrofiche ed ipertrofiche)
- Dispepsie non ulcerose
- Mucositi intestinali iatrogene

ISTRUZIONI PER L'USO E POSOLOGIA:

Adulti:

1 Bustina da 10 ml 2 volte al giorno lontano dai pasti (preferibilmente ore 10.00 - ore 22.00) per almeno 20 giorni consecutivi o secondo parere medico.

AVVERTENZE E MISURE PRECAUZIONALI:


- Non utilizzare in caso di incompatibilità nota con i singoli componenti del prodotto.
- Non assumere se ipersensibili o allergici ad uno dei componenti
- Anche se non sono conosciuti effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza o nei primi mesi dell'allattamento. In ogni caso, consultare prima il proprio medico.
- Il prodotto non è destinato ai bambini.
- In caso di terapie farmacologiche concomitanti, si raccomanda di consultare il medico prima dell'utilizzo del dispositivo.
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Non superare la dose giornaliera raccomandata.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Una volta aperta la bustina utilizzare tutto il contenuto.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono noti effetti indesiderati correlati all'utilizzo di HEPILOR Liquido. Nel caso in cui si verificano interrompere il trattamento e consultare il medico

CONSERVAZIONE:

Conservare nella confezione originale in luogo fresco e al riparo da fonti di calore.

CONFEZIONE:  20 Bustine Monodose da 10 ml €

CE 0477

Data ultima revisione: **Maggio 2019**



Fabbricante:
Labomar S.p.A.
Via N. Sauro, 35 - 31036 Istrana (TV)

Distributore:
Azienda Farmaceutica Italiana s.r.l.
Via Vibrata, 111 - 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE)

www.aziendafarmaceuticaitaliana.it



7FGI.001167/04