

HEPILOR®

SCHEMA TERAPEUTICO



LESIONI E DISTURBI DELLA MUCOSA ORALE: tre sciacqui al giorno di almeno 2 minuti con **HEPILOR collutorio (10ml)** per 5 giorni.

N.E.R.D.: **HEPILOR Liquido (10ml)** o **1 Stick-Pack** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 10 giorni; continuare **HEPILOR Liquido (10ml)** o **1 Stick-Pack** ore 22, per 20 giorni.

G.E.R.D.: **HEPILOR Liquido (10ml)** o **1 Stick-Pack** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 30 giorni.

PREVENZIONE MUCOSITI DA RADIOCHEMIOTERAPIA: **HEPILOR Liquido (10ml)** o **1 Stick-Pack** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, da tenere in bocca 2 minuti e poi deglutire. Assumere nei giorni del trattamento radiochemioterapico fino alla settimana successiva alla fine del trattamento.

GASTROPROTEZIONE ONCOLOGICA: **1 HEPILOR capsula** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti. Dal giorno prima e fino al quarto giorno dopo la seduta chemioterapica.

GASTRITE ACUTA: **1 HEPILOR capsula** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 20 giorni.

GASTRITE CRONICA: **1 HEPILOR capsula** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 30 giorni.

GASTRITE ATROFICA: **1 HEPILOR capsula** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 30 giorni. Da ripetere 3 volte l'anno.

ULCERA GASTRICA e DUODENALE: **1 HEPILOR capsula** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 30 giorni.

MUCOSITI INTESTINALI IATROGENE: **1 HEPILOR capsula** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 30 giorni.

ERADICAZIONE *H.pylori*: **1 HEPILOR capsula** alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti. 10 giorni prima della terapia eradicante, durante la terapia eradicante, e per 10 giorni dopo la fine della terapia eradicante.

SWITCH CON PPI: **1 HEPILOR capsula o liquido (10ml) o Stick-Pack** in base alla patologia, alle ore 10 e ore 22, lontano dai pasti, per 30 giorni: primi 15 a dosaggio pieno di PPI, i seguenti 15 giorni a dosaggio decrescente del PPI fino a sospensione.

NOTA BENE: AL FINE DI NON RENDERE INEFFICACE LA TERAPIA È NECESSARIO NON ASSUMERE CIBO O LIQUIDI PER ALMENO UN'ORA E NON SCIACQUARSI LA BOCCA PER ALMENO UN'ORA DOPO L'ASSUNZIONE DEL COLLUTORIO

